


کاربرد پورت چیست؟

از طریق پورت می توان تزریقات شیمی درمانی ، تزریق خون ، آنتی بیوتیک و سرم را بدون نیاز به سوراخ کردن رگ انجام داد. همچنین می توان در صورت نیاز برای گرفتن نمونه خون آزمایشات نیز از آن استفاده کرد.

چگونه از پورت استفاده می شود؟

در صورت نیاز بلافاصله بعد از پورت گذاری می توان از آن استفاده نمود. هنگامیکه جهت تزریق داروی شیمی درمانی یا گرفتن نمونه خون از پورت استفاده شود پوست روی محل پورت استریل گردیده و سپس سوزن مخصوص از طریق پوست وارد محفظه می گردد. این عمل دردناک نمی باشد.



پورت چیست:

یکی از مشکلات عمده بیماریانی که نیاز به شیمی درمانی و تزریقات مکرر دارند سوراخ نمودن رگهای مختلف و به تدریج نازک شدن آنها و نهایتا مسدود شدن رگها می باشد. این امر علاوه بر درد و ناراحتی برای بیمار موجب تخریب رگهای محیطی و مشکلات جدیدی برای این بیماران می شود.

چه راه حل مناسبی برای شیمی درمانی وجود دارد؟

استفاده از پورت که در زیر پوست بیمار قرار می گیرید می تواند از بروز این مشکلات جلوگیری نماید و در کشورهای پیشرفته جهت انجام شیمی درمانی از ابتدا پورت گذاری انجام می شود . کاشت این محفظه در زیر پوست که به رگ مرکزی بدن متصل می گردد از روی پوست مشاهده نمی شود و موجب حفظ رگ های محیطی بیمار می گردد.

یا من اسمم خیرا و خذکره شفا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کاشان
مرکز آموزشی درمانی نقوی

NAGHAVI

www.naghavi.kaums.ac.ir

HOSPITAL

عنوان آموزش: پورت گذاری

تهیه و تنظیم: زهرا رضا زاده کارشناس پرستاری

با نظارت واحد آموزش بیمارستان نقوی

چه مراقبت‌هایی بعد از پورت گذاری لازم است؟

در هفته اول ممکن است درد خفیف و کبودی را در محل شکاف تجربه کنید. جهت رفع این درد مصرف مسکن ساده مانند استامینوفن به شما کمک خواهد کرد. بعد از پورت گذاری به مدت ۵ روز آنتی بیوتیک خوراکی به شما داده می شود که برای پیشگیری از عفونت می باشد. در صورت باقی ماندن قرمزی و تورم اطراف محل پورت حتماً بعد از یک هفته به کلینیک یا مطب مراجعه نمایید. بعد از تزریق پورت مقدارب داروی ضد انعقاد خون (هپارین) بداخل پورت تزریق می گردد تا از لخته شدن خون داخل پورت جلوگیری شود. اگر بطور منظم از پورت استفاده نشود لازم است ماهیانه داخل پورت شستشو داده شود.

مشکلات احتمالی

عفونت ممکن است در داخل لوله یا اطراف پورت ایجاد شود. شما در موارد زیر باید فوراً با پزشک خود تماس بگیرید:

دیدن ناحیه قرمز متورم یا دردناک اطراف پورت

علائمی مانند تب، تنگی نفس، لرز و سرگیجه

در این موارد به شما آنتی بیوتیک داده خواهد شد.

در صورت لخته شدن خون در داخل پورت و یا عفونت شدید ممکن است نیاز به خروج پورت باشد. علائم لخته شدن خون در داخل پورت تورم گردن و قرمزی پوست می باشد.

یا وجود پورت در تصویربرداری اختلال ایجاد

می کند؟

خیر، شما با وجود پورت می توانید سی تی اسکن و یا ام آر آی را براحتی انجام دهید.

آیا وجود پورت محدودیتی نیز برای بیمار

ایجاد می کند؟

معمولاً نه، ولی باید از انجام حرکاتی که باعث کشش می شوند و می توانند باعث حرکت و آسیب به پورت شوند مانند شنا، وزنه برداری خودداری کرد.

مدت زمان استفاده از پورت چقدر می باشد؟

پورت را می توان برای هفته ها، ماهها و در صورت نیاز تا سالها حفظ کرد.

کاشان ، خیابان شهید رجایی ، بیمارستان نقوی

بخش جراحی بیمارستان نقوی

۵۵۵۴۱۵۱۵ داخلی ۲۲۱

www.naghavi.kaums.ac.ir

با آرزوی بهبودی و سلامتی

